

2023년 HPV 국가예방접종 지원사업 안내



지원 대상 및 지원 내용

- 지원 대상** 만 12~17세 여성 청소년 (2005. 1. 1. ~ 2011. 12. 31. 출생자)
만 18~26세 저소득층* 여성 (1996. 1. 1. ~ 2004. 12. 31. 출생자)
*「국민기초생활보장법」상 기초생활보장수급자 및 차상위계층(기준중위소득 50% 이하)
- 지원 내용** HPV 예방접종 2~3회 지원
※ 만 12세(10~11년생)는 접종과 건강상담 함께 제공

접종 기관


- 지정의료기관** 예방접종도우미 누리집에서 확인(<https://nip.kdca.go.kr>)
보건소 지자체 상황에 따라 보건소에서 예방접종이 불가능할 수 있으니 방문 전 확인

접종 횟수

- ☑ HPV 1차 접종 당시 만 12~14세 2회, 만 15세 이상 3회

권장 접종 간격

1차접종 나이 만 12~14세



1차접종 나이 만 15세 이상

서바릭스(HPV2)



가다실(HPV4)



※ 자세한 접종 일정은 접종 당일 지정의료기관 또는 보건소에서 상담

예방접종 전·후 주의사항

- ☑ 안전한 예방접종을 위해 미성년자는 보호자와 동행하도록 합니다.
- ☑ 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받도록 합니다.
- ☑ 중증도 이상의 심한 급성질환이 있는 경우에는 접종을 연기하나, 감기 등 가벼운 질환을 앓는 경우는 접종 시행 가능합니다.
- ☑ 접종부위는 청결하게 유지합니다.
- ☑ 예방접종 후 20~30분간 접종기관에 앉아있거나 누워있는 것으로 더욱 안전한 접종이 가능합니다.
- ☑ 예방접종 후 2~3일간은 주의 깊게 관찰하고, 평소와 다른 신체증상이 나타날 경우 반드시 의사의 진료를 받도록 합니다.


2023년 HPV 국가예방접종 지원사업 안내



의료기관 방문 시 예방접종 행동수칙



방문 전 접종가능여부
사전확인



생활방역수칙
실천



손소독 등
개인위생 수칙 준수



대상자, 보호자
코로나 증상 있을 시
내원 전 알리기



접종 후 현장에서
20~30분 머물며
이상반응 관찰 후 귀가

다음의 경우 예방접종을 받으면 안됩니다.

- ☑ 이전 사람유두종바이러스 감염증 백신 접종 후 심한 알레르기 반응이 있었던 경우
- ☑ 사람유두종바이러스 감염증 백신성분에 심한 알레르기 반응을 보인 경우

사람유두종바이러스 감염증 예방접종 후 발생 가능한 이상반응

- 국소 반응: 접종 부위 통증, 부어오름, 발적 등
 - * 접종부위 통증이 비교적 흔하게 보고(약 80%)되고 있고, 가만히 있어도 통증이 느껴지거나 일상 활동을 방해할 정도의 통증이 약 6%에서 보고되었으나 대부분 수일 내에 특별한 치료 없이 회복됩니다.
- 전신 반응: 발열, 메스꺼움, 근육통, 실신, 매우 드물게 아나필락시스 등
 - * 아나필락시스와 같은 심한 알레르기 반응을 포함한 중증 이상반응이 나타날 수 있지만 매우 드물고, 예방접종 전후 주의사항을 잘 지키고 접종을 받으면 안전에 문제가 없습니다.

예방접종 후 이상반응 국가보상제도

- ☑ 증상들이 심해지거나 장기간 지속되는 경우, 또는 그 밖에 다른 전신 이상반응이 생기는 경우에는 의료기관을 방문하여 진료 받으신 뒤 주민등록상 주소지의 보건소에 신고합니다.
- ☑ 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>)의 '예방접종 이상반응신고'에서 신고 가능합니다.

* 예방접종도우미 누리집 → 안전한 예방접종 → 이상반응 신고제도 안내 → 예방접종 신고하기

※ 사람유두종바이러스(HPV)백신 접종 후 이상반응 발생 시 피해보상 신청은 국가예방접종으로 도입(2016.6.20.)된 이후 시행한 접종부터 해당되고, 예방접종 후 이상반응이 발생한 날로부터 5년 이내 신청 가능합니다.